

УТВЕРЖДАЮ:

ИИ Хабибуллина Р.И. «_____»

«_____» 20 _____ г.

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К УЛЬТРАЗВУКОВЫМ ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ИССЛЕДОВАНИЯМ

УЗИ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ

Для женщин репродуктивного возраста исследование желательно проводить на 5-10-й день цикла (считая от первого дня начала менструации).

Для женщин в менопаузе исследование можно проводить в любое удобное время.

УЗИ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

Исследование проводится натощак - за 6 часов до процедуры нельзя есть и пить.

За 3 дня до предстоящего исследования рекомендована легкая диета: исключаются продукты, усиливающие перистальтику кишечника и газообразование (мучные изделия, черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные и алкогольные напитки).

При повышенном газообразовании в течение трех дней принимать препараты-адсорбенты (активированный уголь, лигнин гидролизный, кремния диоксид коллоидный).

За 3 дня до процедуры не проводить рентгеновские исследования с введением.

За сутки до исследования не проводить гастроскопию, колоноскопию, клизмы.

УЗИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА

За 3 часа до обследования мочевого пузыря не опорожнять!(узи сначала проводится на полный мочевой пузырь, после опорожнения мочевого пузыря УЗИ проводится трансвагинальным доступом (или трансректальным доступом).

За 3 дня до предстоящего исследования рекомендована легкая диета: исключаются продукты, усиливающие перистальтику кишечника и газообразование (мучные изделия, черный хлеб, сырые овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные и алкогольные напитки).

При повышенном газообразовании в течении трех дней принимать препараты-адсорбенты (активированный уголь, лигнин гидролизный, кремния диоксид коллоидный).

За 3 дня до процедуры, не проводить рентгеновские исследования с введением.

За сутки до исследования не проводить гастроскопию, колоноскопию, клизмы.

Скрининговое УЗИ в 1-м триместре (12 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней) с расчетом рисков на синдром Дауна, Патау, Эдварса, презклампсию, задержку роста плода и преждевременные роды по программе Астрайя проводиться натошак (допускается прием пищи после сдачи крови).

УЗИ ПО БЕРЕМЕННОСТИ

Во 2 и 3 триместрах проводятся без подготовки, за исключением следующих ситуаций:

1. При проведение цервикометрии (трансвагинальное ультразвуковое исследование шейки матки) мочевого пузыря должен быть опорожнен;
2. Для оценки эхографических признаков патологии приращения плаценты мочевого пузыря должен быть умеренно наполнен.